

Геологический институт РАН  
Беломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова  
Российский фонд фундаментальных исследований

# **ПОЗДНЕ- И ПОСТГЛЯЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОГО МОРЯ: ГЕОЛОГИЯ, ТЕКТОНИКА, СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ОБСТАНОВКИ, ХРОНОЛОГИЯ**

**Материалы Всероссийской научной конференции.  
Сборник статей**



**ГИН РАН, ББС МГУ**  
(пос. Приморский, Лоухский район,  
Республика Карелия)

**14–22 сентября 2018 г.**



УДК 551.242.2

ББК 26.324

М34

*Издание подготовлено при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-05-20050)*

М34 Материалы Всероссийской научной конференции «Поздне- и постгляциальная история Белого моря: геология, тектоника, седиментационные обстановки, хронология»: сборник статей. – М.: «КДУ», «Университетская книга», 2018. – 196 с.

ISBN 978-5-91304-855-4

В сборник включены статьи, подготовленные участниками всероссийской научной конференции «Поздне- и постгляциальная история Белого моря: геология, тектоника, седиментационные обстановки, хронология», проходившей на Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 14–22 сентября 2018 г. Представлены результаты научных исследований, посвященных геологии и тектонике Беломорского региона, динамике уровня Белого моря в голоцене, береговым процессам, палеоэкологическим реконструкциям, следам древних и исторических землетрясений Беломорья, седиментационным процессам, а также гидрологической эволюции и экологической сукцессии в водоемах, отделяющихся от Белого моря в ходе постгляциального поднятия берега.

The Proceedings book includes articles prepared by the participants of the All-Russian Scientific Conference «The Late-and Postglacial History of the White Sea: Geology, Tectonics, Sedimentation Environments, Chronology», held at the White Sea Biological Station n. a. N.A. Pertsov, of the Biological Faculty of Moscow State University, in September 14–22, 2018 The results of scientific research on geology and tectonics of the White Sea region, the dynamics of the White Sea level in the Holocene, coastal processes, paleoecological reconstructions, traces of ancient and historical earthquakes of the White Sea coast, sedimentation processes, as well as hydrological evolution and ecological succession in the meromictic lakes separated from the White Sea during the postglacial raising of the coast are presented in the Conference papers.

УДК 551.242.2

ББК 26.324

© ГИН РАН, 2018

© БС МГУ, 2018

© «КДУ», 2018

ISBN 978-5-91304-855-4

# МИКРОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ И МИКРООРГАНИЗМЫ ОЗЕРА ТРЕХЦВЕТНОЕ – МЕРОМИКТИЧЕСКОГО ВОДОЁМА НА ПОБЕРЕЖЬЕ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ

Саввичев А.С.<sup>1</sup>, Летаров А.В.<sup>1</sup>, Лунина О.Н.<sup>1</sup>,  
Веслополова Е.Ф.<sup>1</sup>, Демиденко Н.А.<sup>2</sup>,  
Кокрятская Н.М.<sup>3</sup>, Краснова Е.Д.<sup>4</sup>, Горленко В.М.<sup>1</sup>

Меромиктические водоемы, имеющие вертикальную стратификацию по температуре и содержанию солей, являются классическими объектами исследований лимнологов, биогеохимиков, микробиологов [Кузнецов, 1970]. В водной толще меромиктических водоемов в слое хемоклина развивается сложное многослойное микробное сообщество, участвующее в преобразовании соединений углерода, серы, железа, марганца [Ivanov et al., 2001; Pimenov et al., 2003; Саввичев с соавт., 2004, Crowe et al., 2010; Galand et al., 2012; Wand et al., 2006].

Озеро Трехцветное (66° 35.53' N, 32° 59.97' E) – меромиктический водоем классического типа. Это небольшое (150 м в ширину и 340 м в длину) озеро с максимальной глубиной 7,5 м расположено в 12 км от ББС МГУ. Название «Трехцветное» этому озеру дано за отчетливое различие в окраске трех слоев водной толщи [Пантюлин, Краснова, 2011]. Актуальность исследования водоемов, отделенных от основного морского бассейна, связана, прежде всего, с необходимостью прогноза негативных последствий сероводородного заражения в искусственно замкнутых морских акваториях, появившихся в результате строительства дамб, плотин, приливных электростанций и т.д.

**Общая численность и биомасса микроорганизмов.** Микроскопирование окрашенных препаратов показало крайне неравномерное распределение микроорганизмов в водной толще оз. Трехцветное (рис. 1).

---

<sup>1</sup> Саввичев А.С., Летаров А.В., Лунина О.Н., Веслополова Е.Ф., Горленко В.М. – Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского ФИЦ РАН, Москва.

<sup>2</sup> Демиденко Н.А. – Государственный океанографический Институт им. Н.Н. Зубова, Москва.

<sup>3</sup> Кокрятская Н.М. – Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск.

<sup>4</sup> Краснова Е.Д. – МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва.




Рис. 1. Общая численность микроорганизмов (ОЧМ) водной толщи оз. Трехцветное

Величина общей численности микроорганизмов (ОЧМ) была относительно высокой в верхнем кислородсодержащем водном слое (ср. 3,0 млн кл мл<sup>-1</sup>). В высокоплотном «густо-зеленом» слое хемоклина величина ОЧМ достигала крайне высоких значений — до 60 млн кл мл<sup>-1</sup> (слой 1,8 м) в зимний сезон 2013 г. и до 210 млн кл мл<sup>-1</sup> (слой 2,0 м) в сентябре 2014 г. Средний объем клеток бактерий в аэробной водной толще составлял 2,5 мкм<sup>3</sup>, а в «густо-зеленом» слое достигал 2,0 мкм<sup>3</sup>. Соответственно величина микробной биомассы в аэробном слое составляла 0,5–0,7 мг л<sup>-1</sup>, а в слое максимальной плотности 42 мг л<sup>-1</sup>.

**Продукция фотосинтеза и интенсивность темновой CO<sub>2</sub> ассимиляции в водной толще озера.** Для меромиктических водоемов и для оз. Трехцветное, в частности, характерно два типа фотосинтеза: кислородный, осуществляемый эукариотическими водорослями и цианобактериями в поверхностном водном слое и анаэробный, осуществляемый анаэробными фототрофными бактериями (АФБ) в глубинном слое. В августе в аэробной зоне активность фотосинтеза была зарегистрирована в поверхностном слое до 1,8 м включительно (рис. 2).

Интенсивность кислородного фотосинтеза составляла 12–24 ммоль С л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup>. На нижней границе аэробной зоны интенсивность фотосинтеза резко снижалась. Второй, более выраженный, чем первый, пик световой фиксации углекислоты проявлялся в верхней части сероводородсодержащего, «густо-зеленом» слоя, на горизонтах 1,9 и

2,0 м (до 240 мкмоль С л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup>). При дальнейшем погружении интенсивность фотосинтеза резко падает и, в минимальных значениях обнаруживается даже в придонном горизонте (до 0,8 мкмоль С л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup>).




Рис. 2. Интенсивность кислородного (ОФ) фотосинтеза и анаэробного (АнФ) фотосинтеза в водной толще оз. Трехцветное в зимний и летний сезоны

Темновая ассимиляция углекислоты (ТАУ) является суммарным показателем, включающим как интенсивность гетеротрофного карбоксилирования, так и автотрофное потребление углекислоты при хемосинтезе. В аэробном водном слое величина ТАУ является характеристикой активности фототрофного и гетеротрофного бактериопланктона (3–6,5 мкмоль С л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup> в августе, (рис. 2)). В этом водном слое хемоавтотрофные процессы протекают слабо, из-за недостатка неорганических восстановителей. В зеленом слое величина ТАУ скачкообразно возрастает до 27,3 и 47,8 мкмоль С л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup> в сентябре. На нижележащих водных горизонтах величина ТАУ плавно падает от редокс-зоны к придонному слою (до 8,0–14,0 мкмоль С л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup> в сентябре). Процесс ассимиляции углекислоты осуществляется как за счет анаэробных гетеротрофных микроорганизмов, так и за счет анаэробных хемоавтотрофов: гидрогенотрофных сульфатредукторов и метаногенов.

**Анаэробные фототрофные бактерии оз. Трехцветное.** Из накопительного флакона, с глубины 1 м, была выделена культура ЗСБ штамм *GrTcv12*. Клетки были мелкие, неподвижные, округлые или овальные, размером 0,1–0,15 x 0,2–0,3 мкм, содержали газовые вакуоли и могли образовывать короткие и длинные (более 20 клеток) изогнутые нити. Оптимальная соленость для роста штамма *GrTcv12*

составляла 5–10 г/л NaCl. Фотосинтетическими пигментами были Бхл *d* и каротиноид хлоробактин. Из колоний, выросших на агаризованной среде при посеве пробы воды с глубины 1,5 м, были выделены пурпурные серные бактерии (ПСБ) *AmTcv13*. Это были неподвижные округлые клетки 1–1,7 мкм в диаметре, содержащие газовые вакуоли и капли серы. Культура хорошо вырастала при солености 10–35 г/л NaCl, оптимальная соленость составляла 10 г/л. По данным сиквенса 16S рДНК штамм *AmTcv13* оказался наиболее близок к штамму *Thiocapsa sp. AmPS10* (номер Генбанка КС702856), выделенному из озера Кисло-Сладкое осенью 2010 г. [Лунина с соавт., 2014], и имеет с ним 99% сходства.

**Процесс бактериальной сульфатредукции.** Проведенные радиоизотопные эксперименты показали, что процесс сульфатредукции (СР) начинает реально проявляться на горизонте 1,75 м, соответствующему верхнему горизонту редокс зоны. Ниже интенсивность СР возрастает и достигает максимально высоких значений (19–34 мкмоль S л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup>) в «густо-зеленом» водном горизонте 2,0–2,1 м. Именно на этом горизонте процесс образования свежего ОВ за счет аноксигенного фотосинтеза протекает наиболее активно. Ниже 2,1 м интенсивность СР снижается: до 15 мкмоль S л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup> на горизонте 2,5 м и до 10 мкмоль S л<sup>-1</sup> сут<sup>-1</sup> на горизонте 6,0 м. Изотопный состав углерода ОВ взвеси в поверхностном слое водоема оказался близок к значениям, характерных для пресноводной взвеси, что указывает на влияние пресного стока из окружающих озеро заболоченных берегов.

Горизонт 1,5 м, который характеризуется локальным максимумом активности оксигенного фотосинтеза был обогащен тяжелым изотопом углерода ОВ ( $\delta^{13}\text{C}_{\text{Сорг.}} = -25,1\text{‰}$ ) в составе новообразованного автохтонного фитопланктона. Увеличение доли тяжелого изотопа связано с фракционированием, осуществляемым оксигенными фототрофами, потребляющими преимущественно легкий изотоп карбонатного углерода [Пименов с соавт., 2008]. Начиная с горизонта 1,75 м и до 2,1 м наблюдается заметное облегчение изотопного состава углерода ОВ ( $\delta^{13}\text{C}_{\text{Сорг.}} = -28,8\text{‰} - -32,9\text{‰}$ ). В глубинном анаэробном водном слое величина  $\delta^{13}\text{C}_{\text{Сорг.}}$  варьирует от -25,4 до -26,0‰, а величина  $\delta^{13}\text{C}_{\Sigma\text{CO}_2}$  от -8,9 до -9,2‰, при этом эффективность фракционирования составляет  $\Delta = 16,4 - 16,9\text{‰}$ . Облегчение изотопного состава минерального углерода в придонных горизонтах связано с интенсивными процессами анаэробной деструкции ОВ, образованного сообществом аноксигенных фототрофных, хемотрофных и метанотрофных микроорганизмов в вышерасположенном водном слое.

Среди многих прибрежных водоемов Кандалакшского побережья, имеющих ограниченную связь с основным морским бассейном, оз. Трехцветное выделяется наибольшей стабильностью гидрологического режима. В настоящее время абсолютная отметка уреза воды (замер 2014 года) составляет 0,85 м [Краснова с соавт., 2014]. Озеро отделено от Пеккелинской губы заросшей протокой, при этом поступление свежей морской воды является крайне редким событием, случающимся при совпадении сильного нагонного ветра с сизигийным приливом. Вероятно, что именно стабильность в стратификации приводит к существованию плотного «зеленого слоя». Плотные микробные слои, выделяющиеся и различимые за счет своего естественного красного или зеленого цвета, иногда получали название «бактериальных пластин» [Vila et al., 1998; Garcia-Gil et al., 1999; Camacho et al., 2001, Rogozin с соавт., 2010]. Было показано, что численность пурпурных серных бактерий в плотном слое оз. Махони (Mahoney), Канада превышает 10<sup>8</sup> кл мл<sup>-1</sup> [Overmann, 1997]. Исследованное нами озеро Трехцветное отличалось тем, что фототрофное микробное сообщество плотного слоя было представлено только зелеными серными бактериями. Общая численность микроорганизмов в этом слое достигала 2,1 × 10<sup>8</sup> кл мл<sup>-1</sup>.

Авторы признательны коллегам из разных учреждений, принявших участие в летних и зимних исследованиях оз. Трехцветное Д.А. Воронову, Н.Л. Фроловой, С.В. Пацаевой, А.В. Харчевой, С.А. Забелиной, Г.Н. Лосюк. Работа выполнена с использованием финансовых средств грантов РФФИ 17-04-01263 и 16-05-00548.

### Литература

- [1] Краснова Е.Д., Демиденко Н.А., Пантюлин А.Н., Фролова Н.Л., Ефимова Л.Е., Широкова В.А. Термический и ледовый режимы реликтовых водоемов, отделяющихся от Белого моря // Динамика и термина рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей : труды VIII Межд. научно-практической конф.: в 2 т. – М.: РУДН, 24–27 ноября 2014 г. – М.: РУДН, 2014. – С. 430–443.
- [2] Кузнецов С. И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. – Л.: Наука, 1970. 440 с.
- [3] Лунина О. Н., Саввичев А.С., Пименов Н.В., Кузнецов Б.Б., Горленко В.М. Аноксигенные фототрофные бактерии оз. Кисло-Сладкое (Кандалакшский залив Белого моря) // Микробиология. 2013. Т. 82. №6. –С. 815–832.
- [4] Пантюлин А.Н., Краснова Е.Д. Отделяющиеся водоемы Белого моря: новый объект для междисциплинарных исследований. «Гео-